

Novavax XFG COVID-19 疫苗接種方式及上傳 NIIS 劑別

年齡	COVID-19 疫苗 接種史	接種方式				NIIS 登錄劑別	
		一般		有免疫不全或免疫低下者 ^b			接種 劑量
		接種劑數	與前劑接種間隔	接種劑數	與前劑接種間隔		
滿 12 歲至 64 歲	未曾接種 COVID-19 疫苗	1 劑	---	2 劑	第 1 劑與前劑間隔 12 週以上， 第 1-2 劑間隔 6 個月以上	0.5 mL	1、2
	曾接種 COVID-19 疫苗	1 劑	12 週以上 ^a	2 劑			
65 歲以上 (含 55 歲以上原住民) ^b	未曾接種 COVID-19 疫苗	2 劑	第 1-2 劑間隔 6 個月以上	2 劑			1、2
	曾接種 COVID-19 疫苗	2 劑	第 1 劑與前劑間隔 12 週以上， 第 1-2 劑間隔 6 個月以上	2 劑			

註：

a、12 週=84 天。

b、65 歲以上長者、55 歲以上原住民及滿 6 個月以上且有免疫不全或免疫低下者等對象，接種後間隔 6 個月(180 天)以上，可再增加接種 1 劑 COVID-19 疫苗。其中免疫不全或免疫低下者，包括目前正進行或 1 年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者[包括高劑量類固醇, alkylating agents, antimetabolites, transplant-related immunosuppressive drugs, cancer chemotherapeutic agents, tumor-necrosis factor (TNF) blockers, other biologic agents that are immunosuppressive or immunomodulatory 等]、過去 6 個月內接受化學治療或放射治療者、其他經醫師評估免疫不全或免疫力低下者。